

Madárinfluenza A/H5N8 – információ

A madárinfluenza házi- és vadon élő madarak betegsége. A kórokozó influenza vírus változékonysága miatt kialakulhat a vírusnak olyan változata, mely embereket is képes megbetegíteni.

A madárinfluenza tünetei :

A vadmadarak sokszor tünetmentesek maradnak, a házimadarak esetében a klinikai tünetek különfélék lehetnek: Kezdeti tünet lehet az étvágytalanság, a folyadékfelvétel csökkenése és a viszonylag kismértékű elhullás. Más esetben hirtelen, akár előzetes tünetek nélküli, vagy általános tüneteket követő (bágyadtság, étvágytalanság, borzolt tollazat) magas elhullási arány tapasztalható.

Nagyon ritkán az ember is megfertőződhet, leggyakrabban a fertőzött állattal való közvetlen érintkezés esetén – a beteg és elhullott állatokkal való közvetlen kapcsolattal, alapvető személyi higiénai követelmények elmulasztásával, esetleg a beteg, elhullott állatok váladékával fertőzött por belégzésével.

Lappangási idő a madárinfluenzánál átlagosan - 7 – maximum 10 nap.

A madárinfluenza gyanúja felmerülhet minden olyan megbetegedésnél, amelynél magas láz, köhögés, torokfájás, nehéz légzés lép fel és a beteg az előző tíz napban madárinfluenza – vírus által érintett térségben volt és közvetlen kapcsolatba került a beteg vagy elhullott állatokkal.

Amennyibe fertőzött vagy elhullott állatot találunk:

- kerüljük az állatokkal való közvetlen érintkezést
- azonnal jelentsük a helyi községi vagy városi hivatalba vagy a regionális állategészségügyi és élelmiszerfelügyeleti hivatalba.
- tartsuk be az alapvető személyi higiéniai szabályokat

Vtáčia chrípka A/H5N8 – informácia

Vírus vtácej chrípky je vírusové prenosné ochorenie vtákov, hydiny, prípadne iných zvierat s ťažkým priebehom, ktoré často končí uhynutím.

Vírus bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný už vo viacerých krajinách Európy. Na Slovensku už boli tiež potvrdené ochorenia vo viacerých oblastiach.

Prirodzeným rezervoárom vtáčích kmeňov chrípky sú sťahovavé vodné vtáky, predovšetkým divoké kačice.

Prenos vtácej chrípky na človeka je možný priamym kontaktom s chorými, resp. uhynutými zvieratami pri nedodržaní zásad osobnej hygieny, vdýchnutím prachu s obsahom výlučkov chorých, resp. uhynutých zvierat, kontaktom s infikovanými plochami a povrchmi (napr. povrch vajec), výlučkami z chorých zvierat a odpadmi.

Vírusy vtácej chrípky môžu potenciálne vyvolať ochorenia aj u ľudí, riziko prenosu je hlavne u ľudí prichádzajúcich sa do styku s vtákmi (domácimi alebo voľne žijúcimi).

V prípade, že pozorujeme uhynuté vtáctvo je nutné:

- **vyvarovať sa akémukoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom**
- **čo najskôr o tejto skutočnosti upovedomiť príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu**
- **pri prípadnej manipulácii s chorým alebo uhynutým vtákom je nutné používať osobné ochranné pomôcky (ochranné rukavica, tvárovú masku, okuliare, ochranný plášť, nepremokavú obuv).**

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom musia:

- sledovať svoj zdravotný stav
- v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich pre možnú chrípku bezodkladne kontaktovať svojho obvodného lekára

Prejavy chrípky:

Infekcia vírusom chrípky ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Nástup je obvykle náhly, často sa začína zimnicou, bolesťami hlavy, zvýšenými teplotami. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škrabania v hrdle.

Liečba:

Liečba chrípky je symptomatická, v prípade potreby je možné použiť antivirotiká. **Očkovanie proti sezónnej chrípke môže prispieť k ľahšiemu priebehu ochorenia.**